

# БІБЛОК (ЕСМОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД) 10 мг/мл

1 мл = 20 кр

ВАГА ПАЦІЄНТА	НАВАНТА-ЖУЮЧА ДОЗА (ПРОТЯГОМ 1 ХВ)	ПІДТРИМУЮЧА ДОЗА (ТИТРУВАТИ ДО БАЖАНОГО ЕФЕКТУ)				ПІДТРИМУЮЧА ДОЗА (ТІЛЬКИ ПРИ ІНТРА- АБО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ)	
кг	500 мкг/кг	50 мкг/кг/хв	100 мкг/кг/хв	150 мкг/кг/хв	200 мкг/кг/хв	250 мкг/кг/хв	300 мкг/кг/хв
185	9,25 мл за 1 хв 185 кр за 1 хв	55,5 мл/год 18,5 кр/хв	111 мл/год 37 кр/хв	166,5 мл/год 55,5 кр/хв	222 мл/год 74 кр/хв	277,5 мл/год 92,5 кр/хв	333 мл/год 111 кр/хв
180	9 мл за 1 хв 180 кр за 1 хв	54 мл/год 18 кр/хв	108 мл/год 36 кр/хв	162 мл/год 54 кр/хв	216 мл/год 72 кр/хв	270 мл/год 90 кр/хв	324 мл/год 108 кр/хв
170	8,5 мл за 1 хв 170 кр за 1 хв	51 мл/год 17 кр/хв	102 мл/год 34 кр/хв	153 мл/год 51 кр/хв	204 мл/год 68 кр/хв	255 мл/год 85 кр/хв	306 мл/год 102 кр/хв
160	8 мл за 1 хв 160 кр за 1 хв	48 мл/год 16 кр/хв	96 мл/год 32 кр/хв	144 мл/год 48 кр/хв	192 мл/год 64 кр/хв	240 мл/год 80 кр/хв	288 мл/год 96 кр/хв
150	7,5 мл за 1 хв 150 кр за 1 хв	45 мл/год 15 кр/хв	90 мл/год 30 кр/хв	135 мл/год 45 кр/хв	180 мл/год 60 кр/хв	225 мл/год 75 кр/хв	270 мл/год 90 кр/хв
140	7 мл за 1 хв 140 кр за 1 хв	42 мл/год 14 кр/хв	84 мл/год 28 кр/хв	126 мл/год 42 кр/хв	168 мл/год 56 кр/хв	210 мл/год 70 кр/хв	252 мл/год 84 кр/хв
130	6,5 мл за 1 хв 130 кр за 1 хв	39 мл/год 13 кр/хв	78 мл/год 26 кр/хв	117 мл/год 39 кр/хв	156 мл/год 52 кр/хв	195 мл/год 65 кр/хв	234 мл/год 78 кр/хв
120	6 мл за 1 хв 120 кр за 1 хв	36 мл/год 12 кр/хв	72 мл/год 24 кр/хв	108 мл/год 36 кр/хв	144 мл/год 48 кр/хв	180 мл/год 60 кр/хв	216 мл/год 72 кр/хв
110	5,5 мл за 1 хв 110 кр за 1 хв	33 мл/год 11 кр/хв	66 мл/год 22 кр/хв	99 мл/год 33 кр/хв	132 мл/год 44 кр/хв	165 мл/год 55 кр/хв	198 мл/год 66 кр/хв
100	5 мл за 1 хв 100 кр за 1 хв	30 мл/год 10 кр/хв	60 мл/год 20 кр/хв	90 мл/год 30 кр/хв	120 мл/год 40 кр/хв	150 мл/год 50 кр/хв	180 мл/год 60 кр/хв
90	4,5 мл за 1 хв 90 кр за 1 хв	27 мл/год 9 кр/хв	54 мл/год 18 кр/хв	81 мл/год 27 кр/хв	108 мл/год 36 кр/хв	135 мл/год 45 кр/хв	162 мл/год 54 кр/хв
80	4 мл за 1 хв 80 кр за 1 хв	24 мл/год 8 кр/хв	48 мл/год 16 кр/хв	72 мл/год 24 кр/хв	96 мл/год 32 кр/хв	120 мл/год 40 кр/хв	144 мл/год 48 кр/хв
70	3,5 мл за 1 хв 70 кр за 1 хв	21 мл/год 7 кр/хв	42 мл/год 14 кр/хв	63 мл/год 21 кр/хв	84 мл/год 28 кр/хв	105 мл/год 35 кр/хв	126 мл/год 42 кр/хв
60	3 мл за 1 хв 60 кр за 1 хв	18 мл/год 6 кр/хв	36 мл/год 12 кр/хв	54 мл/год 18 кр/хв	72 мл/год 24 кр/хв	90 мл/год 30 кр/хв	108 мл/год 36 кр/хв
50	2,5 мл за 1 хв 50 кр за 1 хв	15 мл/год 5 кр/хв	30 мл/год 10 кр/хв	45 мл/год 15 кр/хв	60 мл/год 20 кр/хв	75 мл/год 25 кр/хв	90 мл/год 30 кр/хв

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Бібллок

Склад: 1 мл містить есмололу гідрохлориду 10 мг; допоміжні речовини: натрію ацетат; кислота оцтова; натрію хлорид; натрію гідроксид; кислота хлористоводнева; вода для ін'єкцій. Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина, безбарвна або світло-жовтого кольору. Фармакотерапевтична група. Селективні блокатори бета-адренорецепторів. Код АТХ С07А В09. Фармакодинаміка. Есмолол – бета-селективний блокатор адренергічних рецепторів. БІБЛОК має властивості бета-блокаторів: зниження ЧСС; збільшення часу відновлення СА-вузла; затримка АВ-провідності; пролонгація АВ-інтервалу; продовження часу PQ, індукція АВ-блокади; пролонгація рефрактерного періоду передсердь і шлуночків; негативний інотропний ефект зі зниженням ФВ; зниження АТ. Показання. Надшлуночкова тахіаритмія, мерехтлива аритмія, тріпотіння передсердь, синусова тахікардія. Тахікардія і артеріальна гіпертензія у періопераційний період. Протипоказання. Тяжка синусова брадикардія; синдром дисфункції синусового вузла; порушення АВ і СА провідності; АВ-блокада 2-го або 3-го ступеня; кардіогенний шок; тяжка гіпотензія; декомпенсована СН; вік до 18 років; годування груддю; гіперчутливість. Побічна дія. Реакції гіперчутливості; головний біль; гіпотензія; брадикардія; АВ блокада; підвищення тиску в легеневій артерії; серцева недостатність; шлуночкові екстрасистолії; вузловий ритм; стенокардія; периферична ішемія. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник ТОВ «Юрія-Фарм». РП МОЗ України UA/16313/01/01 від 28.09.2017 до 28.09.2022.

Інформація для професійної діяльності спеціалістів медицини і фармацевції. Для розповсюдження на семінарах, конференціях на медичну тематику. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитися з повною інструкцією з медичного застосування!