

БІБЛОК (ЕСМОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД) 10 МГ/МЛ

ВАГА ПАЦІЄНТА	НАВАНТАЖУЮЧА ДОЗА (ПРОТЯГОМ 1 ХВ)	ПІДТРИМУЮЧА ДОЗА (ТИТРУВАТИ ДО БАЖАНОГО ЕФЕКТУ)				ПІДТРИМУЮЧА ДОЗА (ТІЛЬКИ ПРИ ІНТРА- АБО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ)	
		50 мкг/кг/хв	100 мкг/кг/хв	150 мкг/кг/хв	200 мкг/кг/хв	250 мкг/кг/хв	300 мкг/кг/хв
кг	500 мкг/кг	50 мкг/кг/хв	100 мкг/кг/хв	150 мкг/кг/хв	200 мкг/кг/хв	250 мкг/кг/хв	300 мкг/кг/хв
185	92.5 мг 9.25 мл	9 250 мкг/хв 55.5 мл/год	18 500 мкг/хв 111 мл/год	27 750 мкг/хв 166.5 мл/год	37 000 мкг/хв 222 мл/год	46 250 мкг/хв 277.5 мл/год	55 500 мкг/хв 333 мл/год
180	90 мг 9 мл	9 000 мкг/хв 54 мл/год	18 000 мкг/хв 108 мл/год	27 000 мкг/хв 162 мл/год	36 000 мкг/хв 216 мл/год	45 000 мкг/хв 270 мл/год	54 000 мкг/хв 324 мл/год
170	85 мг 8.5 мл	8 500 мкг/хв 51 мл/год	17 000 мкг/хв 102 мл/год	25 500 мкг/хв 153 мл/год	34 000 мкг/хв 204 мл/год	42 500 мкг/хв 255 мл/год	51 000 мкг/хв 306 мл/год
160	80 мг 8 мл	8 000 мкг/хв 48 мл/год	16 000 мкг/хв 96 мл/год	24 000 мкг/хв 144 мл/год	32 000 мкг/хв 192 мл/год	40 000 мкг/хв 240 мл/год	48 000 мкг/хв 288 мл/год
150	75 мг 7.5 мл	7 500 мкг/хв 45 мл/год	15 000 мкг/хв 90 мл/год	22 500 мкг/хв 135 мл/год	30 000 мкг/хв 180 мл/год	37 500 мкг/хв 225 мл/год	45 000 мкг/хв 270 мл/год
140	70 мг 7 мл	7 000 мкг/хв 42 мл/год	14 000 мкг/хв 84 мл/год	21 000 мкг/хв 126 мл/год	28 000 мкг/хв 168 мл/год	35 000 мкг/хв 210 мл/год	42 000 мкг/хв 252 мл/год
130	65 мг 6.5 мл	6 500 мкг/хв 39 мл/год	13 000 мкг/хв 78 мл/год	19 500 мкг/хв 117 мл/год	26 000 мкг/хв 156 мл/год	32 500 мкг/хв 195 мл/год	39 000 мкг/хв 234 мл/год
120	60 мг 6 мл	6 000 мкг/хв 36 мл/год	12 000 мкг/хв 72 мл/год	18 000 мкг/хв 108 мл/год	24 000 мкг/хв 144 мл/год	30 000 мкг/хв 180 мл/год	36 000 мкг/хв 216 мл/год
110	55 мг 5.5 мл	5 500 мкг/хв 33 мл/год	11 000 мкг/хв 66 мл/год	16 500 мкг/хв 99 мл/год	22 000 мкг/хв 132 мл/год	27 500 мкг/хв 165 мл/год	33 000 мкг/хв 198 мл/год
100	50 мг 5 мл	5 000 мкг/хв 30 мл/год	10 000 мкг/хв 60 мл/год	15 000 мкг/хв 90 мл/год	20 000 мкг/хв 120 мл/год	25 000 мкг/хв 150 мл/год	30 000 мкг/хв 180 мл/год
90	45 мг 4.5 мл	4 500 мкг/хв 27 мл/год	9 000 мкг/хв 54 мл/год	13 500 мкг/хв 81 мл/год	18 000 мкг/хв 108 мл/год	22 500 мкг/хв 135 мл/год	27 000 мкг/хв 162 мл/год
80	40 мг 4 мл	4 000 мкг/хв 24 мл/год	8 000 мкг/хв 48 мл/год	12 000 мкг/хв 72 мл/год	16 000 мкг/хв 96 мл/год	20 000 мкг/хв 120 мл/год	24 000 мкг/хв 144 мл/год
70	35 мг 3.5 мл	3 500 мкг/хв 21 мл/год	7 000 мкг/хв 42 мл/год	10 500 мкг/хв 63 мл/год	14 000 мкг/хв 84 мл/год	17 500 мкг/хв 105 мл/год	21 000 мкг/хв 126 мл/год
60	30 мг 3 мл	3 000 мкг/хв 18 мл/год	6 000 мкг/хв 36 мл/год	9 000 мкг/хв 54 мл/год	12 000 мкг/хв 72 мл/год	15 000 мкг/хв 90 мл/год	18 000 мкг/хв 108 мл/год
50	25 мг 2.5 мл	2 500 мкг/хв 15 мл/год	5 000 мкг/хв 30 мл/год	7 500 мкг/хв 45 мл/год	10 000 мкг/хв 60 мл/год	12 500 мкг/хв 75 мл/год	15 000 мкг/хв 90 мл/год

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Біблок

Склад: 1 мл містить есмололу гідрохлориду 10 мг; допоміжні речовини: натрію ацетат; кислота оцтова; натрію хлорид; натрію гідроксид; кислота хлористоводнева; вода для ін'єкцій. Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина, безбарвна або світло-жовтого кольору. Фармакотерапевтична група. Селективні блокатори бета-адренорецепторів. Код АТХ С07А В09. Фармакодинаміка. Есмолол – бета-селективний блокатор адренергічних рецепторів. БІБЛОК має властивості бета-блокаторів: зниження ЧСС; збільшення часу відновлення СА-вузла; затримка АВ-провідності; пролонгація АВ-інтервалу і продовження часу PQ, індукція АВ-блокади; пролонгація рефрактерного періоду передсердь і шлуночків; негативний інотропний ефект зі зниженням ФВ; зниження АТ. Показання. Надшлуночкова тахіаритмія, мерехтлива аритмія, тріпотіння передсердь, синусова тахікардія. Тахікардія і артеріальна гіпертензія у періопераційний період. Протипоказання. Тяжка синусова брадикардія; синдром дисфункції синусового вузла; порушення АВ і СА провідності; АВ-блокада 2-го або 3-го ступеня; кардіогенний шок; тяжка гіпотензія; декомпенсована СН-вік до 18 років; годування груддю; гіперчутливість. Побічна дія. Реакції гіперчутливості; головний біль; гіпотензія; брадикардія; АВ блокада; підвищення тиску в легневій артерії; серцева недостатність; шлуночкові екстрасистоли; вузловий ритм; стенокардія; периферична ішемія. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник ТОВ «Юрія-Фарм», РП МОЗ України UA/16313/01/01 від 28.09.2017 до 28.09.2022.

Інформація для професійної діяльності спеціалістів медицини і фармацевції. Для розповсюдження на семінарах, конференціях на медичну тематику. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитися з повною інструкцією з медичного застосування!